

中藥材「漏蘆」與「藜蘆」的使用指引

漏蘆

(一)、藥材基源

菊科植物祁州漏蘆 *Rhaponticum uniflorum* (L.) DC.
的乾燥根。



(二)、性狀

根圓錐狀或扁平塊狀，多扭曲，長短不一。直徑 1~2.5cm。表面暗棕色、灰褐色或黑褐色，粗糙，具縱溝及菱形的網狀裂隙，外層易剝落。根頭部膨大，有殘莖基及鱗片狀葉基，頂端有灰白色絨毛。體輕而質脆，易折斷，斷面不整齊，灰黃色，有裂隙，中心有的呈星狀裂隙，灰黑色或棕黑色。氣特異，味微苦。

(三)、功能主治

清熱解毒，消癰，下乳，舒筋通脈。用於乳癰腫痛，癰疽發背，瘰癧瘡毒，乳汁不通，濕痹拘攣。

(四)、用法用量

5~9 克。

(五)、注意事項

孕婦慎用。曾發生誤將藜蘆當作漏蘆使用，而出現中毒症狀。

藜蘆

(一)、藥材基源

百合科植物藜蘆 *Veratrum nigrum* L. 的乾燥根及根莖。



(二)、性狀

根莖圓柱形或圓錐形，長 2~4cm，直徑 0.5~1.5cm。表面棕黃色或土黃色。頂端殘留葉基及黑色纖維，形如蓑衣，有的可見斜方形的網眼，下部著生 10~30 條細根，根細長略彎曲，長 10~20cm，直徑 0.1~0.4cm；黃白色或黃褐色，具細密的橫皺紋。斷面類白色，中心有淡黃色細木心，與皮部分離。體輕，質堅脆。氣微，味苦、辛，有刺喉感；粉末有強烈的催嚏性。

(三)、功能主治

吐風痰，殺蟲毒。用於中風痰壅，喉痹不通，癰癤等症。油調外塗，治疥癬禿瘡。

(四)、用法用量

0.3~0.9 克，多入丸、散用；外用研末或調敷。

(五)、注意事項

本品有毒；體虛氣弱及孕婦忌服；不宜與人參、西洋參、沙參、丹參、玄參、苦參、黨參、細辛、芍藥同用。

(六)、中毒症狀

中毒時表現為上腹部燒灼感、流涎、惡心、嘔吐、呃逆及出汗。口周圍麻木、口及手指刺痛、視力模糊，嚴重者可有便血、意識喪失、譫妄、四肢痙攣、震顫、血壓下降、心率顯著減慢、心律失常，因呼吸中樞受抑制及支氣管痙攣可出現呼吸困難。

倘若居民服用含有藜蘆的湯劑或成藥後而出現上述中毒症狀，須立即停止服用並前往醫院就診。